

PREGLEDAJ SE!

Spriječi
RAK
vrata
maternice



Što je preventivni pregled?

Preventivni ginekološki pregled uključuje uzimanje uzoraka za Papa test koji otkriva promjene na stanicama vrata maternice. Za žene starije od 30 godina kao test probira na rak preporučuje se i test na HPV koji može otkriti visokorizične tipove HPV-a koji mogu uzrokovati rak.

Zašto ga obaviti?

Redoviti ginekološki pregledi s probirnim testiranjem mogu otkriti promjene na stanicama ili visokorizične tipove HPV-a koji mogu uzrokovati rak.

Kada ga obaviti?

Obično se preporučuje od 21. godine života i redovito ga periodično ponavljati.

CIJEPI SE!

CIJEPLJENJE PROTIV HPV-A PRUŽA SIGURNU, UČINKOVITU I DUGOTRAJNU ZAŠTITU OD HPV INFEKCIJA KOJE MOGU UZROKOVATI RAK.

Kada se treba cijepiti?

Djeca od 11 do 14 godina cijepi se s dvije doze u razmaku od 6 do 12 mjeseci.
Djeca mogu primiti cjepivo već u dobi od 9 godina.
Mladi u dobi od 15 do 25 godina cijepi se s tri doze.
Odrasli se cijepi s tri doze, prema preporukama liječnika.

Sigurnost cjepiva protiv HPV-a

HPV cjepivo je u Hrvatskoj i svijetu u uporabi od 2006. godine te je distribuirano preko 500 milijuna doza diljem svijeta. U svim državama EU/EEA i brojnim državama svijeta uvršteno je u nacionalni program cijepljenja. U Hrvatskoj je u nacionalni program cijepljenja uvedeno 2016. godine. Medicinska struka preporučuje cijepljenje koje može zaštititi od raka i drugih bolesti koje uzrokuje HPV.



<https://www.hzjz.hr/dokumenti/cijepljenjeprotiv-humanog-papiloma-virusa-hpv-2/>



<https://hpv.hr/>

Izdavač: Hrvatska liga protiv raka
Glavni urednik: prof.dr.sc. Damir Eljuga, dr.med.
Autorice teksta: Neda Ferenčić Vrbanić, dr.med. i prim.
Tatjana Nemeth Blažić, dr.med.



HZJZ



CroMSIC



Pitajte svog
liječnika gdje se
možete cijepiti
ili provjerite na
mrežnim
stranicama!

ZAUSTAVIMO
RAK
UZROKOVAN
HPV -om

INFORMIRAJ SE

CIJEPI SE

PREGLEDAJ SE

HPV cjepivo je besplatno
za sve osobe od 9 do 25 godina.
Od navršanih 26 godina prema
medicinskoj indicaciji.

INFORMIRAJ SE!

8 od 10 ljudi
će dobiti HPV
u nekom
trenutku
svog života.

Kako se humani papilomavirus (HPV) prenosi?

Spolnim odnosom ili intimnim kontaktom kože ili sluznice na kožu ili sluznicu s osobom koja ima infekciju, čak i kad ona nema znakove ili simptome.

Može li osoba dobiti HPV više puta?

Da, a istovremeno može imati infekciju s više tipova virusa.


Kod većine ljudi infekcija nema vidljivih simptoma i prođe spontano zahvaljujući imunološkom sustavu. No infekcija HPV-om može uzrokovati genitalne bradavice, a dugotrajna infekcija visokorizičnim tipovima virusa može uzrokovati šest vrsta raka, kod žena kao i kod muškaraca.

Možete imati HPV čak i ako:

- nemate nikakve simptome ili tegobe.
- ste imali samo jednog seksualnog partnera ili partnericu.

HPV INFEKCIJA SE
NE MOŽE LIJEČITI,
**CIJEPLJENJE JE NAJBOLJA
PREVENCIJA**

HPV uzrokuje:



Postoji oko
**200 tipova
HPV-a.**


Rak vrata maternice:

najčešći je rak koji se povezuje s HPV-om. U više od 99% slučajeva raka vrata maternice izoliran je HPV. Rak vrata maternice je četvrti najčešći rak kod žena u svijetu.

On je jedan od češćih oblika raka kod mladih žena. U Hrvatskoj od ovog raka svakog dana jedna žena oboli, a svaki treći dan jedna žena umre!

Koji su simptomi raka vrata maternice?

Rak vrata maternice obično nema simptome u početnom stadiju. Međutim, kako bolest napreduje, može uzrokovati različite simptome koji uključuju:



Ovi simptomi mogu biti uzrokovani i drugim stanjima, stoga je važno posjetiti liječnika radi postavljanja dijagnoze. Redoviti pregledi koji uključuju Papa test i test na HPV ključni su za rano otkrivanje i liječenje predstadija i rane faze raka vrata maternice, kada je liječenje uspješnije.